

# PROSPECTO DORMIFLORA RELAX

MEDIDAS: 80 mm x 160 mm (frente & dorso)

FECHA: 08/02/2021

## DORMIFLORA® RELAX

**Tilo - Valeriana - Passiflora - Ciclobenzaprina HCl**  
Miorrelajante - Tranquilizante Natural

Comprimidos Recubiertos - Vía Oral

### Fórmula:

Cada comprimido recubierto contiene:  
Extracto seco de Tilo (flores).....75 mg  
Extracto seco de Valeriana (raíz).....50 mg  
Extracto seco de Passiflora (flores).....75 mg  
Ciclobenzaprina HCl.....2,5 mg  
Excipientes.....c.s.

### Indicaciones:

Está indicado para el alivio de los cuadros de estrés, ansiedad, nerviosismo, hiperexcitabilidad, trastornos del sueño de origen nervioso, espasmos gastrointestinales, taquicardia, en los cuales coexisten tensión y contractura, en los que se desea una acción sedante suave y de relajación, sin efectos secundarios desagradables, sin riesgo de acostumbramiento.

### Mecanismo de Acción:

La combinación de los componentes de Dormiflora Relax aumenta el efecto tranquilizante, favoreciendo un sueño natural sin sensación de aturdimiento y somnolencia al despertar.

La presencia de la ciclobenzaprina le confiere acción relajante del músculo estriado esquelético sin interferir con la función muscular. La ciclobenzaprina relaja la contractura y disminuye el tono del músculo esquelético por acción sobre los sistemas motores (gamma) y (alfa) a nivel del SNC. La ciclobenzaprina es bien absorbida, circula estrechamente unida a las proteínas plasmáticas, se metaboliza primariamente en hígado y su excreción tiene predominio renal. La eliminación es lenta y variable, su vida media oscila entre 1 y 3 días.

### Posología:

Mayores de 18 años: 1 o 2 comprimidos recubiertos preferentemente 30 minutos o 1 hora antes de acostarse. La dosis se ajustará de acuerdo al criterio médico y a las características del cuadro clínico.

### Contraindicaciones:

No administrar a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes.  
Está contraindicado en personas con problemas de ritmo cardiaco.

### Reacciones Adversas/Efectos Colaterales:

En raros casos pueden presentarse somnolencia, sequedad bucal, mareo, náuseas, reacciones gastrointestinales o alérgicas que desaparecen al suspender el tratamiento.

### Precauciones y Advertencias:

No debe ser administrado a mujeres embarazadas o en lactancia sin prescripción médica. Por la presencia de la ciclobenzaprina, químicamente relacionada con los antidepresivos tricíclicos y los parasimpaticolíticos, debe ser utilizado con cuidado en pacientes con antecedentes de retención urinaria, glaucoma de ángulo estrecho, aumento de la presión intraocular o en tratamiento con medicación anticolinérgica. Administrar con precaución en pacientes con infarto agudo de miocardio, trastornos del ritmo cardiaco, hipertiroidismo. La ciclobenzaprina y el extracto seco de Valeriana pueden disminuir la capacidad mental o física requerida para realizar tareas riesgosas.

No administrar a niños ni ancianos, sin consultar al médico.

### Efectos sobre la capacidad de conducir:

Puede producir somnolencia, sensación de mareo, visión borrosa en algunos

pacientes. Se aconseja precaución en la utilización de vehículos o maquinaria peligrosa y en el desempeño de otras actividades que requieran un estado especial de alerta.

### Interacciones Medicamentosas:

Si está en tratamiento con algún otro medicamento sedante, tranquilizante o para dormir, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Por la presencia de la ciclobenzaprina, la interacción con IMAO puede ocasionar crisis de hipertermia, convulsiones. Es teóricamente posible el bloqueo del efecto antihipertensivo de la guanetidina y los congéneres cuando se administran concomitantemente.

### Conservación:

Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a 30°C).  
Mantener fuera del alcance de los niños.  
No utilizar después de la fecha de vencimiento.

### Presentaciones:

Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos.  
Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos.  
Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

### Sobredosis:

En caso de sobredosis recurrir al Hospital más cercano o al Centro Nacional de Toxicología en el Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción - Paraguay. Teléfono: (021) 220 418.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

D.T.: Q.F. Gabriela Enciso  
Reg. Prof. N° 4.671

Venta Bajo Receta - Industria Paraguaya




LABORATORIOS GALENO S.A. -  
División NATUHERBS  
Ruta 1 Miel, Francisco Solano López,  
km. 16 2001 San Lorenzo - Paraguay.  
Tel.: (+595-21) 583 235  
www.galeno.com.py

ARTE & DISEÑO

DIRECCIÓN TÉCNICA

COMERCIAL

COLOR



FIRMA

FECHA: / / HORA: :

FIRMA

FECHA: / / HORA: :

FIRMA

FECHA: / / HORA: :