

GRIPIDOL® COMPUESTO

Paracetamol - Cafeína - Difenhidramina HCl -
Bromhexina HCl

Antigripal - Analgésico - Antifebril - Antialérgico - Expectorante

**Comprimidos Recubiertos / Solución Oral
Vía Oral**

Fórmula:

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol.....	500 mg
Cafeína.....	50 mg
Difenhidramina HCl.....	25 mg
Bromhexina HCl.....	8 mg
Excipientes.....	c.s.

Cada 5 mL contiene:

Paracetamol.....	120 mg
Difenhidramina HCl.....	10 mg
Bromhexina HCl.....	4 mg
Excipientes.....	c.s.

Indicaciones:

Estados gripales y febriles con tos.

Mecanismo de Acción:

La bromhexina es un mucolítico empleado en el tratamiento de los trastornos respiratorios asociados a la tos productiva.

Se absorbe rápidamente en el tubo digestivo. Se distribuye ampliamente en los tejidos corporales, se excreta por orina principalmente como metabólicos.

La difenhidramina clorhidrato se utiliza en el alivio sintomático de procesos alérgicos. Es un antihistamínico con notables propiedades antimuscarínica

La cafeína inhibe la fosfodiesterasa y tiene un efecto antagonista sobre los receptores centrales de adenosina. Es un estimulante del Sistema Nervioso Central y aumenta la actividad mental. También estimula el centro respiratorio, incrementando la frecuencia y profundidad respiratoria.

Se absorbe en el tracto gastrointestinal y se excreta en la orina.

El paracetamol ejerce su acción analgésica inhibiendo la síntesis de prostaglandinas del Sistema Nervioso Central y bloqueando la generación del impulso doloroso a nivel periférico. El paracetamol produce la antipirexia actuando a nivel central sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura.

Posología:

*Comprimidos recubiertos:

Tomar 1 comprimido cada 6 u 8 horas, de acuerdo a criterio médico.

*Solución oral:

-Niños menores a 5 años: según criterio médico.

-Niños mayores a 5 años: 5 mL cada 6 u 8 horas.

-Adultos: 10 mL cada 6 u 8 horas.

No se debe administrar por más de 7 días, salvo criterio médico debido al daño hepático que puede ocasionar.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Debe utilizarse con precaución en pacientes con una historia de úlcera

péptica.

Se requiere también cuidado con los pacientes asmáticos.

No usar durante el embarazo y periodo de lactancia.

La sobredosis de paracetamol puede ocasionar alteraciones hepáticas graves y a veces necrosis tubular renal aguda.

Reacciones Adversas:

Erupciones cutáneas u otras reacciones de hipersensibilidad.

También se ha descrito la presencia de náusea, vómito, anorexia, dolor epigástrico somnolencia, daño hepático o renal, hipotermia, sangrado gastrointestinal, gastritis, vértigo, alteración de la coordinación. Rara vez pueden observarse sequedad de boca, nariz y/o garganta, escalofríos, hipotensión, taquicardia, constipación, diarrea, fatiga, excitación, insomnio, visión borrosa y retención urinaria.

Precauciones y Advertencias:

Utilizar con precaución en casos de hipertensión arterial suave a moderada, hipertiroidismo, diabetes, enfermedades cardíacas, glaucoma, diabetes mellitus, insuficiencia renal moderada a severa y en aquellos pacientes con dificultad en la micción por hipertrofia prostática. Evitar el uso concomitante de bebidas alcohólicas o sedantes (barbitúricos en particular). Ante la aparición de nerviosismo, mareos o falta de sueño, discontinue la medicación y consulte con su médico.

Interacciones medicamentosas:

El riesgo de toxicidad por paracetamol puede aumentar en pacientes que reciben otros fármacos potencialmente hepatóxicos o que induzcan las enzimas microsómicas hepáticas.

Conservación:

Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación:

Caja conteniendo 12 comprimidos recubiertos.

Exhibidor conteniendo 25 blísters x 4 comprimidos recubiertos.

Caja conteniendo frasco x 120 mL.

Sobredosis:

Ante la eventualidad de una sobredosis concurrir al Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción – Paraguay, Tel.: (021) 220 418.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

D.T.: Q.F. Gabriela Enciso

Reg. Prof. N° 4.671

Industria Paraguaya – Venta Bajo Receta



LABORATORIOS
GALENO S.A.

LABORATORIOS GALENO S.A.
Ruta 1 Mcal. Francisco Solano
López, km 15,200, San Lorenzo –
Paraguay.
Tel.: (+595-21) 583 235
www.galeno.com.py