

PROSPECTO DISTONEX DIGEST

MEDIDAS: 80 mm x 160 mm

FECHA: 12/11/2021

DISTONEX® DIGEST NF

Simeticona - Pancreatina - Extracto de bilis de buey Digestivo – Antiflatulento

Comprimidos Recubiertos - Vía Oral

Fórmula:

Cada comprimido recubierto contiene:

Simeticona.....	50 mg
Pancreatina.....	200 mg
Extracto de bilis de buey.....	50 mg
Excipientes.....	c.s.

Indicaciones:

La simeticona reduce la tensión superficial y cuando se administra vía oral, produce la fusión de las burbujas de gas en el tubo digestivo, lo que contribuye a su dispersión. Induce el alivio de la flatulencia y el malestar abdominal por exceso de gas gastrointestinal en procesos como la dispepsia y la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

La pancreatina está indicada para los casos de insuficiencia enzimática pancreática. Dispepsia. Pancreatitis.

Esta asociación de simeticona, pancreatina y extracto de bilis de buey están indicadas para el tratamiento sintomático de los trastornos digestivos y como suplemento en situaciones en las que haya déficit de las enzimas digestivas naturales.

Mecanismo de Acción:

La simeticona es el agente con propiedades antiespumígenas e hidrófobas.

La pancreatina, los componentes enzimáticos de la pancreatina (tripsina, amilasa y lipasa) potencia la digestión de proteínas, almidón y grasas en el tracto gastrointestinal, principalmente en el medio alcalino del duodeno y yeyuno proximal. La tripsina rompe las grandes fracciones proteicas en péptidos; la amilasa convierte el almidón en maltosa y la lipasa hidroliza las grasas en ácidos grasos y glicerol.

El extracto de bilis de buey potencia la acción lipolítica de la lipasa y colabora en la emulsión de las grasas y la absorción de ácidos grasos.

Posología:

Dosis usual para adultos: tomar 1 o 2 comprimidos recubiertos antes de las comidas principales, a menos que el médico indique lo contrario.

Contraindicaciones:

Pacientes que sean hipersensibles a los componentes de la fórmula, así como obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de la fórmula como el extracto seco de bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del hígado y agravar la sintomatología.

Precauciones y Advertencias:

Se recomienda no utilizar durante el primer trimestre del embarazo y durante la lactancia.

Reacciones Adversas/Efectos colaterales:

A dosis excesivas puede, ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

Interacciones medicamentosas:

La pancreatina reduce la eficacia de la acarbosa.

Conservación:

Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Presentación:

Caja conteniendo 18 comprimidos recubiertos.

Exhibidor con 25 blísteres conteniendo 4 comprimidos recubiertos.

Sobredosis:

Ante la eventualidad de una sobredosis concurrir al Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción – Paraguay, Tel.: (021) 220 418.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

D.T.: Q.F. Gabriela Enciso
Reg. Prof. N°: 4.671

Venta Bajo Receta – Industria Paraguaya



LABORATORIOS
GALENO S.A.

LABORATORIOS GALENO S.A.
Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López,
km 15-200, San Lorenzo – Paraguay.
Tel.: (+598-21) 583 235
www.galeno.com.py

COLOR

Pantone 235 C - 100%

ARTE & DISEÑO

FIRMA

FECHA: / / HORA: :

DIRECCIÓN TÉCNICA

FIRMA

FECHA: / / HORA: :

COMERCIAL

FIRMA

FECHA: / / HORA: :