

Corrección:

MEDIDA: 80 mm x 160 mm (frente y dorso)

HEPASTRONG®

Boldo - Carqueja - Alcachofa - Melisa Digestivo Natural

Solución - Gotas Orales / Vía Oral

Fórmula.

Cada mL (30 gotas) contiene:

<i>Peumus boldus</i> Molina.....	0,4 mL.
(hojas - Extracto fluido de boldo)	
<i>Baccharis articulata</i>	0,1 mL.
(parte aérea desecada - Extracto fluido de carqueja)	
<i>Cynara scolymus</i>	0,2 mL.
(hojas - Extracto fluido de alcachofa)	
<i>Melissa officinalis</i>	0,1 mL.
(hojas - Extracto fluido de Melissa Officialis)	
Excipientes.....	c.s.p.

Acción terapéutica atribuida, fundamentada.
Digestivo Natural.

Indicaciones.
Digestivo natural, Hepato-vesicular.

Mecanismo de Acción
Extracto fluido de boldo: ha demostrado poseer propiedades hepatoprotectoras y coleréticas.
Extracto fluido de alcachofa: su principal principio aromático amargo la Cinarina, le confiere propiedades coleréticas, colagogas, hepatoprotectoras e hipocolesterolemiantes.
Extracto fluido de carqueja: entre las actividades biológicas demostradas por diferentes extractos de carqueja se puede mencionar a nivel digestivo la actividad antiúlceroza, y la acción hepatoprotectora y colagoga demostrada por su flavonoides.
Extracto de Melisa: se le atribuyen propiedades antispasmodicas.

Posología.
Adultos: 40 a 50 gotas, tres veces por día antes o después de las comidas en agua con limón o azucarada.
Niños: mayores de 12 años: 10 a 15 gotas, tres veces al día antes o después de las comidas en agua con limón o azucarada o según prescripción médica.

Contraindicaciones.
-En los casos de reacciones de hipersensibilidad a los componentes de la formulación.
-En mujeres embarazadas o en período de lactancia.
-Su efecto a nivel vesicular hace que no se recomiende en casos de obstrucción de vías biliares.

Reacciones Adversas/Efectos Colaterales.
Generalmente es bien tolerado. Solo en dosis muy elevada pueden producir irritación renal, vómitos y diarrea, dolor ocular, rash cutáneo (reacción alérgica).

Precauciones y Advertencias.
Este producto debe ser tomado con precaución en pacientes que padezcan hipertensión arterial y glaucoma o que estén ingiriendo antiácidos, bicarbonato de sodio, ketoconazol, cloruro de potasio, ipratropio o procainamida y antieméticos. Si usted está tomando alguna medicación recetada, no ingiera este producto sin consultar a su médico. Si los síntomas persisten más de siete días deberá consultar a su médico.

No debe ser administrado a menores de 12 años y a ancianos sin consultar a su médico.

Interacciones Medicamentosas.
Las interacciones que contengan cualquiera de los siguientes medicamentos dependiendo la cantidad presente, pueden interactuar con esta medicación. Tales como: antiácidos que contengan calcio y/o magnesio; bicarbonato de sodio, ketoconazol, cloruro de potasio; ipratropio o procainamida y antieméticos. No se han identificado las interacciones específicas. Sin embargo, debido a la disminución de la movilidad gastrointestinal y al retraso en el vaciado gástrico, la absorción de los medicamentos orales puede disminuir durante el uso simultáneo con los alcaloides.

Conservación.
Almacenar a temperatura controlada (15°C a 30°C).
Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Presentaciones.
Caja conteniendo 1 frasco x 30 mL.

Sobredosificación.
Ante la eventualidad de una sobredosis concurrir al Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción – Paraguay.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

D.T.: Q.F. Gabriela Enciso
Reg. Prof. N° 4.671

Venta Libre en Farmacias – Industria Paraguaya



LABORATORIOS GALENO S.A.
Ruta 1 km 15,200
San Lorenzo, Paraguay
Tel.: (+595-21) 583 235
www.galeno.com.py

**Cian - Magenta
Amarillo - Negro**

Texto Medida Diseño

Aprobado / Firma