

OSTEOGALEN® CAPS

Carbonato de calcio + Vitamina D3

Suplemento Nutricional

Cápsulas duras - Vía Oral

Fórmula.

Cada cápsula dura contiene:

Carbonato de calcio (equiv. a 500 mg de Calcio)..... 1.250 mg

Vitamina D3 (equiv. a 400 U.I. de Vitamina D3)..... 4 mg

Excipientes..... c.s.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL			
Porción: 1 cápsula dura			
Valor energético	Cantidad por porción	Cantidad 100 g	% IDR (*)
kcal	0,52	35,61	0,03 %
kJ	2,17	148,60	0,03 %
Carbohidratos	0,04 g	2,74 g	0,01 %
Proteínas	0,09 g	6,16 g	0,12 %
Grasas totales	0 g	0 g	0 %
Fibra alimentaria	0 g	0 g	0 %
Sodio	0 g	0 g	0 %
Calcio	0,5 g	34,24 g	50 %
Vitamina D3	0,004 g	0,274 g	50 %

(*) Valores mayores a una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Usos y Aplicaciones:

Suplemento de calcio y vitamina D que colabora con la salud ósea.

Posología:

Adultos y personas de edad avanzada: 1 cápsula al día.

Ingerir el producto con agua, preferentemente una hora o una hora y media antes de los alimentos.

Reacciones Adversas:

Puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Poco frecuente: hipercalcemia (niveles altos de calcio en sangre) e hipercalcemia (niveles altos de calcio en orina).

En raras ocasiones: estreñimiento, flatulencia, náuseas, dolor epigástrico y diarrea.

En muy raras ocasiones: prurito (picor), exantema (erupción de la piel) y urticaria (ronchas).

Si nota efectos adversos no mencionados en este prospecto o si sufre alguno de los efectos adversos descritos de forma grave, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Precauciones y Advertencias:

Tenga especial cuidado con Carbonato de calcio 1.250 mg + Vitamina D3 4 mg:

Si tiene insuficiencia renal (incapacidad del riñón para realizar correctamente su función), cálculos en el riñón, una enfermedad del corazón, sarcoidosis (inflamación a nivel de los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado, los

ojos, la piel y otros tejidos), o se encuentra en tratamiento con glucósidos cardíacos (medicamentos utilizados cuando existe una incapacidad del corazón para realizar correctamente su función).

Si recibe un tratamiento conjunto con otros productos con vitamina D, o está sometido a un tratamiento prolongado o con dosis elevadas de suplementos de calcio, es posible que su médico deba efectuar controles clínicos de forma regular. Su médico le indicará la frecuencia de estos controles.

Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada.

En caso de embarazo, lactancia o niños, consultar a su médico antes de consumir este producto.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. Hipercalcemia. Hipercalcemia. Hipercalcemia. Hipercalcemia.

Sobredosis:

-Síntomas:

Las sobredosis agudas y a largo plazo pueden causar hipervitaminosis D e hipercalcemia.

La hipercalcemia produce los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, sed, polidipsia, poliuria y estreñimiento.

La sobredosis crónica puede producir calcificación vascular y extravascular como consecuencia de la hipercalcemia

-Tratamiento:

Interrumpir la administración de calcio y vitamina D y rehidratar al paciente.

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, Asunción – Paraguay.

Presentación:

Caja conteniendo 30 cápsulas duras.

Caja conteniendo 60 cápsulas duras.

Conservación:

Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

Elaborado por:

LABORATORIOS GALENO S.A. – División MIAPHARMA,

Ruta 1 Mcal. Francisco Solano López, km 15,200, San Lorenzo - Paraguay.

D.T.: Q. F. Gabriela Enciso

Reg. Prof. N° 4.671

Venta Libre - Industria Paraguaya

MIA
PHARMA

LABORATORIOS GALENO S.A.
DIVISIÓN MIAPHARMA
Ruta 1 Km 15,200
San Lorenzo, Paraguay
Tel.: (+595-21) 583 235
www.galeno.com.py