

VAGIGALEN®

Clotrimazol – Dexametasona – Gentamicina

Crema Vaginal

Antimicótico. Antibacteriano. Antiinflamatorio.

Fórmula.

Cada 100 g de crema contiene:

Clotrimazol.....	2 g
Dexametasona (Micronizada).....	0,05 g
Gentamicina.....	0,1 g
(Equivalente a 0,1662 g de Gentamicina sulfato)	
Excipientes.....	c.s.

Indicaciones.

Asocia compuestos para el tratamiento de vulvovaginitis de etiologías frecuentes, sean éstas inflamatorias, bacterianas o micóticas y para la protección del epitelio vaginal. Posee un amplio espectro de actividad y una buena tolerancia.

Mecanismo de Acción.

Este producto combina el efecto antiinflamatorio, antipruriginoso y vasoconstrictor de la Dexametasona con la acción antimicótica de amplio espectro del Clotrimazol, y el efecto antibiótico de la Gentamicina.

Todos los efectos resultan de una acción sinérgica.

La Gentamicina tiene una acción bactericida local por bloqueo del sistema RNA e interacción con el DNA.

El Clotrimazol actúa por inhibición de la biosíntesis del ergosterol o de otros esteroides, lo que lesiona la membrana de la pared celular fúngica y altera su permeabilidad.

La Dexametasona suprime la inflamación por inhibición de ciclooxigenasa.

Previene la respuesta del tejido de los procesos inflamatorios, lo que reduce los síntomas de la inflamación.

Posología.

5 g de Vagigalen 1 a 2 veces por día durante 4 a 7 días.

En vulvitis y vulvovaginitis periféricas, extender la crema directamente sobre la zona afectada.

Modo de uso.

1. Perforar el tubo con el tapón perforador
2. Conectar un aplicador vaginal enroscando al tubo.
3. Presione el tubo estirando la parte interna de la cánula hasta que esté completamente llena.
4. Desenrosque el aplicador del tubo, introdúzcalo en la vagina con la cánula profundamente.
5. Retire el aplicador, las cánulas son desechables (arroje la cánula después del uso).

Contraindicación.

No debe ser administrado en pacientes sensibles a cualquiera de sus componentes.

Reacciones Adversas/Efectos colaterales.

Muy rara vez ocasiona fenómenos irritativos locales; ardor, prurito u otros síntomas, que desaparecen al interrumpir el tratamiento.

Precauciones y Advertencias:

Si ocurriese sensibilización local o una reacción alérgica, el tratamiento debe ser interrumpido. Deberán mantenerse medidas higiénicas generales para controlar las fuentes de infección y reinfección.

Interacciones Medicamentosas.

No se conocen interacciones de medicamentos con ninguno de sus componentes. No administrar preparados hormonales concomitantemente, salvo que se prescriba en forma específica.

Restricciones de Uso:

El uso prolongado de antibióticos, ocasionalmente puede ocasionar la proliferación de microorganismos no susceptibles.

Uso durante el embarazo y la lactancia: como no se ha establecido la inocuidad de los corticosteroides en mujeres embarazadas, el médico deberá evaluar la relación riesgo/beneficio antes de recomendar su uso.

Conservación.

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Sobredosis.

Debido a su forma farmacéutica y a su vía de administración, la intoxicación es casi imposible, si ocurriera ingesta accidental debe realizarse un tratamiento sintomático apropiado, incluyendo lavado gástrico.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Centro Nacional de Toxicología, en Emergencias Médicas, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro Mongelós, Asunción – Paraguay, Tel.: (021) 220 418.

Presentación:

Caja conteniendo 1 pomo con 20 g de crema con 4 cánulas.

Caja conteniendo 1 pomo con 50 g de crema con 10 cánulas.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

Elaborado por:

LABORATORIO PHARMA INDUSTRIES S.A.

Calle 1 e/ Avda. Pastora Céspedes y San Antonio, San Lorenzo.

Telefax: (+59521) 520 636/7

Regente: Q.F. Rosario Paredes Carballo

Reg. Prof. N°: 4.584

Para:

LABORATORIOS GALENO S.A.

Regente: Q.F. Gabriela Enciso

Reg. Prof. N° 4.671

Venta Bajo Receta - Industria Paraguaya