

PROSPECTO - MOVILEN BIOTIC

MEDIDAS: 80 mm x 160 mm

FECHA: 09/09/2019

MOVILEN BIOTIC®

Amoxicilina - Ketoprofeno - Papaina

Antibiótico - Antiinflamatorio

Comprimidos Recubiertos - Vía Oral

Fórmula.

Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato).....	500 mg.
Ketoprofeno.....	50 mg.
Papaina (Equiv. a 10.000 U.I.).....	1 mg.
Excipientes.....	c.s.

Indicaciones:

El tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, odontológicas, dérmicas, osteoarticulares, genitourinarias y gineco- obstétricas por bacterias susceptibles.

Mecanismo de Acción:

La Amoxicilina es resistente a la inactivación por el ácido gástrico. Cuando se administra por vía oral, se absorbe más rápida y completamente que la ampicilina. La Amoxicilina es el análogo 4-hidroxilato de la ampicilina y se utiliza en una variedad similar de infecciones por gérmenes sensibles. Estas incluyen la actinomicosis, la bronquitis, la endocarditis, la fiebre tifoidea y paratifoidea, la gastroenteritis, las infecciones bucales, las infecciones del conducto biliar, la neumonía y las enfermedades del bazo.

El Ketoprofeno es un derivado del ácido propionico, es un AINES (antiinflamatorio no esteroide), se utiliza en trastornos reumáticos, en procesos dolorosos e inflamatorios y se absorbe inalterado en el tubo digestivo.

La Papaina está compuesta por una mezcla de papaina y quimo papaina, enzimas proteolíticas que hidrolizan polipéptidos. Amidas y ésteres. Los preparados de Papaina sola o combinada con antibacterianos y/ u otras sustancias, se administran por vía oral por sus supuesta propiedades antiinflamatorias.

Posología:

Adultos: tomar 1 comprimido recubierto cada 8 horas. En gonorrea 6 comprimidos recubiertos en una sola toma.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a las penicilinas y en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal.

No utilizar durante el embarazo y periodo de lactancia.

Reacciones Adversas:

La incidencia de diarrea es menos frecuente con la Amoxicilina que con la Ampicilina.

El ketoprofeno provoca efectos de hipersensibilidad, fotosensibilidad, pancreatitis.

La Papaina puede producir reacciones de hipersensibilidad.

Interacciones Medicamentosas:

La Amoxicilina puede interactuar con los antibacterianos bacteriostáticos como el cloranfenicol y tetraciclinas.

El probenecid retrasa la excreción de Ketoprofeno y disminuye su grado de unión a las proteínas, con lo que aumentan sus concentraciones plasmáticas.

Conservación:

Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación:

Caja conteniendo 12 comprimidos recubiertos.

Sobredosificación:

En casos de sobredosis aguda, se aconseja vaciar el estómago induciendo el vómito o por lavado gástrico, que se podrá realizar tras una ingesta reciente. La administración de carbón activado puede disminuir la absorción de la droga.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción – Paraguay, Tel.: (021) 220 418.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

Elaborado por: Laboratorios Catedral de Scavone Hnos S.A.

Vía Férrea esq. Cándido Vasconellos, Asunción - Paraguay

Para: **LABORATORIOS GALENO S.A.**

D.T.: Q.F. Gabriela Enciso - Reg. Prof. N° 4.671

Venta Bajo Receta Simple Archivada – Industria Paraguaya



LABORATORIOS
GALENO S.A.

LABORATORIOS GALENO S.A.
Ruta 1 km 15,200
San Lorenzo, Paraguay
Tel.: (+595-21) 583 235
www.galeno.com.py

COLOR



320 C

ARTE & DISEÑO

FIRMA

FECHA: / / HORA: :

DIRECCIÓN TÉCNICA

FIRMA

FECHA: / / HORA: :

COMERCIAL

FIRMA

FECHA: / / HORA: :