

DORMIFLORA® RELAX

Tilo – Valeriana – Passiflora - Ciclobenzaprina HCl

Comprimidos Recubiertos- Vía oral

Miorrelajante - Tranquilizante Natural

Fórmula.

Cada comprimido recubierto contiene:

Extracto seco de Tilo.....	75,00 mg.
Extracto seco de Pasiflora.....	75,00 mg.
Extracto seco de Valeriana.....	50,00 mg.
Ciclobenzaprina clorhidrato.....	2,50 mg.
Excipientes.....	c.s.

Acción terapéutica.

Sedante, Tranquilizante natural, Ansiolítico.

Indicaciones

Está indicado para el alivio de los cuadros de estrés, ansiedad, nerviosismo, hiperexcitabilidad, trastornos del sueño de origen nervioso, espasmos gastrointestinales, taquicardia, en los cuales coexisten tensión y contractura, en los que se desea una acción sedante suave y de relajación, sin efectos secundarios desagradables, sin riesgo de acostumbamiento.

Mecanismo de Acción

La combinación de los componentes de Dormiflora aumenta el efecto tranquilizante, favoreciendo un sueño natural sin sensación de aturdimiento y somnolencia al despertar.

La presencia de la Ciclobenzaprina le confiere acción relajante del músculo estriado esquelético sin interferir con la función muscular. La Ciclobenzaprina relaja la contractura y disminuye el tono del músculo esquelético por acción sobre los sistemas motores (gamma) y (alfa) a nivel del SNC. La Ciclobenzaprina es bien absorbida, circula estrechamente unida a las proteínas plasmáticas, se metaboliza primariamente en hígado y su excreción tiene predominio renal. La eliminación es lenta y variable, su vida media oscila entre 1 y 3 días.

Posología.

A criterio del médico. La dosis de referencia es:

Adultos: 1 o 2 comprimidos 2 a 3 veces al día.

Niños mayores de 10 años: 1 comprimido 2 a 3 veces al día. Los comprimidos recubiertos se administrarán preferentemente después del almuerzo y de la cena.

Contraindicaciones.

No administrar a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes.

Está contraindicado en personas con problemas de ritmo cardíaco.

Reacciones Adversas/Efectos colaterales.

En raros casos pueden presentarse somnolencia, sequedad bucal, mareo, náuseas, reacciones gastrointestinales o alérgicas que desaparecen al suspender el tratamiento.

Precauciones y Advertencias:

No debe ser administrado a mujeres embarazadas o en lactancia sin prescripción médica. Por la presencia de la Ciclobenzaprina, químicamente relacionada con los antidepresivos tricíclicos y los parasimpaticolíticos, debe ser utilizado con cuidado en pacientes con antecedentes de retención urinaria, glaucoma de ángulo estrecho, aumento de la presión intraocular o en tratamiento con medicación anticolinérgica. Administrar con precaución en pacientes con infarto agudo de miocardio, trastornos del ritmo cardíaco, hipertiroidismo. La Ciclobenzaprina y el extracto seco de Valeriana pueden disminuir la capacidad mental o física requerida para realizar tareas riesgosas.

No administrar a niños ni ancianos, sin consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducir:

Puede producir somnolencia, sensación de mareo, visión borrosa en algunos pacientes. Se aconseja precaución en la utilización de vehículos o maquinaria peligrosa y en el desempeño de otras actividades que requieran un estado especial de alerta.

Interacciones Medicamentosas.

Si está en tratamiento con algún otro medicamento sedante, tranquilizante o para dormir, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Por la presencia de la Ciclobenzaprina, la interacción con IMAO puede ocasionar crisis de hipertermia, convulsiones. Es teóricamente posible el bloqueo del efecto antihipertensivo de la Guanetidina y los congéneres cuando se administran concomitantemente.

Conservación.

Almacenar a temperatura controlada (entre 15°C - 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

No utilizar después de la fecha de vencimiento.

Presentación

Caja conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

Caja conteniendo 20 comprimidos recubiertos.

Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Sobredosificación.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Centro Nacional de Toxicología, en el Hospital de Emergencias Médicas "Manuel Giagni", sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: (021) 220 418, Asunción – Paraguay.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

Regente: Q.F. Gabriela Enciso

Reg. Prof. N° 4.671

Venta Bajo Receta – Industria Paraguaya