

# DISTONEX® DIGEST NF

Simeticona – Pancreatina – Extracto de Bilis de Buey

Comprimidos Recubiertos - Vía oral

*Digestivo - Antiflatulento*

## **Fórmula.**

Cada comprimido recubierto contiene:

Simeticona.....	50 mg.
Pancreatina.....	200 mg.
Extracto de Bilis de Buey.....	50 mg.
Excipientes.....	c.s.

## **Indicaciones.**

La Simeticona reduce la tensión superficial y cuando se administra vía oral, produce la fusión de las burbujas de gas en el tubo digestivo, lo que contribuye a su dispersión. Induce el alivio de la flatulencia y el malestar abdominal por exceso de gas gastrointestinal en procesos como la dispepsia y la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

La Pancreatina está indicada para los casos de insuficiencia enzimática pancreática. Dispepsia. Pancreatitis.

Esta asociación de Simeticona, Pancreatina y Extracto de Bilis de Buey, están indicadas para el tratamiento sintomático de los trastornos digestivos y como suplemento en situaciones en las que haya déficit de las enzimas digestivas naturales.

## **Mecanismo de Acción.**

La Simeticona, es el agente con propiedades antiespumígenas e hidrófobas. Produce la fusión de las burbujas de gas en el tubo digestivo.

La Pancreatina, los componentes enzimáticos de la pancreatina (tripsina, amilasa y lipasa) potencia la digestión de proteínas, almidón y grasas en el tracto gastrointestinal, principalmente en el medio alcalino del duodeno y yeyuno proximal. La tripsina rompe las grandes fracciones proteicas en péptidos; la amilasa convierte el almidón en maltosa y la lipasa hidroliza las grasas en ácidos grasos y glicerol.

El Extracto de Bilis de Buey, potencia la acción lipolítica de la lipasa y colabora en la emulsión de las grasas y la absorción de ácidos grasos.

## **Posología.**

Dosis usual para adultos: tomar 1 o 2 comprimidos recubiertos antes de las comidas principales, a menos que el médico indique lo contrario.

## **Contraindicaciones.**

Pacientes que sean hipersensibles a los componentes de la fórmula, así como obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de la fórmula como el extracto seco de bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del hígado y agravar la sintomatología.

## **Reacciones Adversas/Efectos colaterales.**

## **Precauciones y Advertencias.**

A pesar de que no se han documentado con certeza los efectos teratogénicos sobre el producto y la madre, se recomienda no utilizar durante el primer trimestre del embarazo y durante la lactancia a reserva de que sea claramente necesario, valorando riesgo-beneficio.

## **Interacciones medicamentosas.**

La Pancreatina reduce la eficacia de la acarbosea.

## **Conservación.**

Almacenar a temperatura controlada (15°C a 30°C). Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar después de la fecha de vencimiento.

## **Presentación.**

Caja conteniendo 18 comprimidos recubiertos  
Exhibidor con 25 blíster conteniendo 4 comprimidos recubiertos

## **Sobredosificación.**

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Centro Nacional de Toxicología, en Emergencias Médicas, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro Mongelós, Asunción – Paraguay, Tel.: 220418.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

Regente: Q.F. Gabriela Enciso  
Reg. Prof. N° 4.671