

PROSPECTO - MOVILEN BIOTIC

FECHA: 06-06-2019

MEDIDA: 80 mm x 160 mm (frente y dorso)

# MOVILEN BIOTIC®

**Amoxicilina - Ketoprofeno - Papaína**

**Antibiótico - Antiinflamatorio**

**Comprimidos Recubiertos - Vía Oral**

**Fórmula.**

Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina (como Trihidrato).....500 mg.  
Ketoprofeno..... 50 mg.  
Papaína.....10.000 U.I.  
Excipientes.....c.s.

**Indicaciones.**

El tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, odontológicas, dérmicas. Osteoarticulares, genitourinarias y gineco- obstétricas por bacterias susceptibles.

**Mecanismo de Acción.**

La Amoxicilina es resistente a la inactivación por el ácido gástrico. Cuando se administra por vía oral, se absorbe más rápida y completamente que la ampicilina.

La Amoxicilina es el análogo 4 - hidroxilato de la ampicilina y se utiliza en una variedad similar de infecciones por gérmenes sensibles. Estas incluyen la actinomicosis, la bronquitis, la endocarditis, la fiebre tifoidea y paratifoidea, la gastroenteritis, las infecciones bucales, las infecciones del conducto biliar, la neumonía y las enfermedades del bazo.

El Ketoprofeno es un derivado del ácido propionico, es un AINES (antiinflamatorio no esteroide), se utiliza en trastornos reumáticos, en procesos dolorosos e inflamatorios y se absorbe inalterado en el tubo digestivo.

La Papaína está compuesta por una mezcla de Papaína y quimo papaína, enzimas proteolíticas que hidrolizan polipéptidos. Amidas y ésteres. Los preparados de Papaína sola o combinada con antibacterianos y/ u otras sustancias, se administran por vía oral por sus supuesta propiedades antiinflamatorias.

**Dosificación.**

Adultos: tomar 1 comprimido recubierto cada 8 horas. En gonorrea 6 comprimidos recubiertos en una sola toma.

**Contraindicaciones.**

Hipersensibilidad a las penicilinas y en pacientes con antecedentes de úlcera gastroduodenal.  
No utilizar durante el embarazo y periodo de lactancia.

**Efectos Secundarios.**

La incidencia de diarrea es menos frecuente con la Amoxicilina que con la Ampicilina.  
El ketoprofeno provoca efectos de hipersensibilidad, fotosensibilidad, pancreatitis.  
La Papaína puede producir reacciones de hipersensibilidad.

**Interacciones Medicamentosas.**

La Amoxicilina puede interactuar con los antibacterianos bacteriostáticos como el cloranfenicol y tetraciclinas. El probenecid retrasa la excreción de Ketoprofeno y disminuye su grado de unión a las proteínas, con lo que aumentan sus concentraciones plasmáticas.

**Conservación.**

Almacenar a temperatura controlada (15°C a 30°C). Mantener fuera del alcance de los niños.

**Presentación.**

Caja conteniendo 12 comprimidos recubiertos.

**Sobredosificación.**

En casos de sobredosis aguda, se aconseja vaciar el estómago induciendo el vómito o por lavado gástrico, que se podrá realizar tras una ingesta reciente. La administración de carbón activado puede disminuir la absorción de la droga. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital de Trauma Prof. Dr. Manuel Giagni, sito en Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós, Asunción - Paraguay, Tel.: (021) 220 418.

Venta Autorizada por la D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.


D.T.: Q.F. Gabriela Enciso - Reg. Prof. N° 4.671

Venta Bajo Receta Simple Archivada - Industria Paraguaya



LABORATORIOS  
**GALENO S.A.**

LABORATORIOS GALENO S.A.  
Ruta 1 km 15,200  
San Lorenzo, Paraguay  
Tel.: (+595-21) 583 235  
www.galeno.com.py



Texto  Medida  Diseño

\_\_\_\_\_  
Aprobado / Firma